


Neuràlgia del trigemin

Què és la neuràlgia del trigemin?

El trigemin és el principal nervi sensitiu del cap i és el nervi motor de la masticació. La neuràlgia del trigemin és un quadre caracteritzat per dolor facial intens, de tipus lancinant o punxant, sever, generalment unilateral, recurrent (episodis de breu durada i inici brusc) i localitzat a la zona facial innervada pel nervi trigemin. Tot i que el dolor pot presentar-se de forma espontània, és habitual la presència de zones gallet en les quals es provoca el dolor en tocar, mastegar, parlar, menjar, somriure, badallar o amb els canvis de temperatura.



La causa de la neuràlgia del trigemin no està clara, però es creu que és deguda a la pèrdua de les cèl·lules que envolten i protegeixen al nervi. Això pot estar produït per algunes malalties, però sovint, no es troba causa desencadenant. En aquests casos, darrera dels brots inicials, acostuma a haver-hi remissions que poden durar mesos o anys.

Com es diagnostica la neuràlgia del trigemin?

El diagnòstic és clínic, en base a la història i a l'exploració física. Per descartar altres possibles causes de dolor facial, el vostre metge pot sol·licitar-vos proves com radiografies, ressonàncies magnètiques nuclears o angiografies.

Com es tracta la neuràlgia del trigemin?

S'acostuma a tractar amb medicació anticonvulsivament, la mateixa que s'utilitza per tractar l'epilèpsia en alguns casos. Quan l'episodi de dolor remet (freqüentment després de 6-12 mesos), s'acostuma a treure la medicació. En alguns casos en què fracassa el tractament, pot ser necessària la cirurgia.

Què he de fer si presento els símptomes?

Dirigeix-te al teu metge de família el més aviat possible. Serà necessari descartar altres malalties i iniciar el tractament el més aviat possible. Malgrat la intensitat del dolor, freqüentment els símptomes remetent sense deixar seqüeles.